発行:公益社団法人日本医師会 発行日: 2021 年 5 月 6 日

日本医師会新型コロナワクチン速報【第9号】

新型コロナウイルスのワクチンに関する現時点における確定情報を速報いたします。必要 とされているにもかかわらず不確定な情報については、確定され次第ご案内いたします。

【目次:第9号】

- 1. 「コミナティ筋注」接種状況について
- 2. 副反応疑い報告の状況について
- 1. 「コミナティ筋注」接種状況について
 - 「コミナティ筋注」を用いた先行接種は2021 年2月17日に始まりました。医療従 事者優先接種は3月から各地で順次開始されています。2021年4月25日までに推定 2,718,090回接種が行われました。

2. 副反応疑い報告の状況について

2021年2月17日から2021年4月25日までの間に医療機関から報告された副反応疑 い報告数は4,402ありました。多く見られたものは、発熱1,413件、倦怠感876 件、頭痛814件、悪寒420件、悪心365件などです。

[厚生労働省 副反応検討部会及び安全対策調査会合同会議(令和3年4月30日開催) 資料3-1-1]

- アナフィラキシ一疑いとして633件が報告され、アナフィラキシーであると医学的 に評価された件数は94件(37件/100万回接種)でした(ブライトン分類1,2,
 - 3) 。「厚生労働省 副反応検討部会及び安全対策調査会合同会議(令和3年4月30日開催) 資料3-5]
- 先行接種者のうち健康観察の調査対象者約2万人の接種後の中間報告によれば、2回 目接種では1回目と比べて発熱や倦怠感、頭痛など症状を自覚する人が増える傾向 があります。多くの場合、症状は一両日中に軽快・回復していました。

「厚生労働省 副反応検討部会及び安全対策調査会合同会議(令和3年4月30日開催) 資料4]

接種後の反応	1回目接種(%)	2 回目接種(%)
	n=19, 190	n=17, 838
発熱 (37.5%以上)	3. 3%	38. 4%
接種部位反応	92. 9%	92.0%
発赤	14. 0%	16.3%
疼痛	92. 3%	90.8%
腫脹	12. 6%	14. 3%
硬結	10. 7%	10.3%
熱感	12. 9%	19. 1%
全身症状	35. 7%	76. 3%
倦怠感	23. 2%	69.6%
頭痛	21. 2%	53. 7%
鼻水	10. 3%	14. 6%

「コミナティ筋注」 (ファイザー社) を接種した後 (1回目と2回目) に報告された症状の頻度